

# ויטמין C

## אבקה מסיסה להגשה במי שתייה

**תכולה:**  
100% ויטמין C גבישי

**התוויות:**  
להקלת תופעות סטרס (הכבדה) הנגרמות מעומס חום ותנאי ממשק לקויים, להגשה במי שתייה.  
יש להגיש ויטמין C לעופות, 24 שעות לפני הופעת גורם ההכבדה ועד 24 שעות לאחר חלוף גורם ההכבדה.  
\*מבוסס על מחקרים על הופמן לרוש.

### **מינון מומלץ:**

- לפני הופעת הסטרס הצפוי (שרב, חיסון, העברה) – 1 גרם ויטמין C לליטר מי שתייה.
- במהלך הסטרס – 0.5 גרם ויטמין C לליטר מי שתייה.
- 24 שעות לאחר הסטרס – 0.25 גרם ויטמין C לליטר מי שתייה.
- יש להכין תמיסה טרייה כל 8 שעות.

**אריזה:** שקית 1 ק"ג

**אחסון:** אחסן במקום קריר ואפל, הרחק מהישג ידם של ילדים ומבעלי חיים.

**לשימוש וטרינרי בלבד For Veterinary use only**

תעודת היתר מספר 160 מאגף המזון לבעלי חיים בשירותים הווטרינריים.

יצרן: הופמן לרוש, שוויץ

אריזה: דור. קי פיתוח ושיווק בע"מ.